

ВНИМАНИЕ НОВИНКА! ВНИМАНИЕ НОВИНКА! ВНИМАНИЕ НОВИНКА!

АКВИФЛОР 200

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ

1000 мл



АКВИФЛОР 200

Для лечения болезней бактериальной этиологии у свиней и птицы

Раствор для приема внутрь
для ветеринарного применения 1000 см³

Мин: флорфеникол.
Состав [в 1 см³]: 200 мг флорфеникола и вспомогательные вещества – до 1 см³.
Режим дозирования: см. инструкцию по применению.
Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Хранить в закрытой упаковке производителя по списку Б, в защищенных от света и прямых солнечных лучей местах, отдалено от продуктов питания и кормов, при температуре от 2°С до 25°С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Запрещается применение лекарственного препарата во истину срок годности.

Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

После вскрытия фляммы неиспользованные остатки препарата хранить из под микр.

Номер регистрационного удостоверения 9677654321.

Документы: РР. 006 «Асконт+».

1СБ. 1. Москва ул. Борисоглебский Вал д. 2.

оф. 1, пом. 20, этаж 42.


По заказу ООО «НПК «Асконт+».

Производитель: Технологическое партнерство продовольственной санитарной

промышленности - Гаврилов Посад, Тульская обл.

Срок №: Годен до:

Баркод:



ТРОПНОСТЬ К ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

- ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ФЛОРФЕНИКОЛА - 20%
- ЭФФЕКТИВЕН В ОТНОШЕНИИ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНЫХ ШТАММОВ
- ПРЕПАРАТ СТАБИЛЕН В МАТОЧНОМ РАСТВОРЕ
- НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ КУРСА ЛЕЧЕНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГАМИ с концентрацией флорфеникола 10%

ВНИМАНИЕ НОВИНКА! ВНИМАНИЕ НОВИНКА! ВНИМАНИЕ НОВИНКА!

АКВИФЛОР 200

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ У СВИНЕЙ И ПТИЦЫ

В 1 мл препарата содержится: флорфеникол – 200 мг

ПОКАЗАНИЯ

Препарат назначают с лечебной целью свиньям, цыплятам-бройлерам и ремонтному молодняку кур при заболеваниях бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к флорфениколу, в том числе:



– **птице** при колисептицемии, пастереллезе, стафиллококкозе, респираторных болезнях бактериальной этиологии, в том числе вызванных *Ornithobacterium rhinotracheale*;



– **свиньям** при плевропневмонии, вызванной *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Haemophilus parasuis*, атрофическом рините, вызванном *Pasteurella multocida* и *Bordetella bronchiseptica*.

1000 мл

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ


Препарат применяют перорально с питьевой водой в суточной дозе:

– **цыплятам** в возрасте до 4-х недель – 50 мл препарата на 100 л воды; другим возрастным категориям птицы – 100 мл препарата на 100 л воды в течение 3-х суток; при сальмонеллезе и смешанных инфекциях – в течение 5 суток;

– **свиньям** – 5 мг флорфеникола на 1 кг живого веса, что соответствует 1 мл препарата на 40 кг живого веса свиньи в течение 5 - 7 дней.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ

Убой свиней на мясо разрешается через 6 суток после применения препарата. Убой птицы разрешается не ранее, чем через 5 суток после последнего применения препарата.



Внешний вид упаковки препарата может отличаться от изображения