

МАСТИСЕПТ АКТИВ

2 ДВА ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВА –
БЫСТРОЕ СНЯТИЕ ВОСПАЛЕНИЯ И БОЛИ

Содержит: метилсалицилат, ибупрофен

+ **экстракт прополиса** + **камфора**

разогревает, регенерирует, обеззараживает


ОПЫТ
УСПЕШНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ В 470
ХОЗЯЙСТВАХ РОССИИ,
БЕЛОРУССИИ,
КАЗАХСТАНА

УНИКАЛЬНЫЙ
СОСТАВ



Внешний вид упаковки препарата
может отличаться от изображения



- ▶ НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ НА РЫНКЕ 
- ▶ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ
- ▶ **ГЕЛЕВАЯ ОСНОВА** – ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ
В КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ

МАСТИСЕПТ АКТИВ

антисептическая противовоспалительная мазь



на гелевой основе

УНИКАЛЬНЫЙ
СОСТАВ

экстракт прополиса

+ камфора

разогревает
регенерирует
обеззараживает



150г

450г

Внешний вид упаковки препарата может отличаться от изображения

СОСТАВ

В 1 г содержится: 50,0 мг камфоры, 20,0 мг метилсалицилата, 20,0 мг ибупрофена, вспомогательные вещества, в том числе экстракт прополиса.

ПОКАЗАНИЯ

Назначают сельскохозяйственным животным для профилактики и лечения клинической и субклинической форм мастита, воспалительных и дегенеративных заболеваний опорно-двигательной системы (артритов, бурситов, тендовагинитов, остеоартрозов, миалгии), травматических повреждений (ушибов, растяжений мышц и связок и пр.).

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Применяют наружно в виде растираний. Препарат наносят 2-3 раза в сутки до выздоровления (в среднем 2-4 суток) на кожные покровы в области воспалительного процесса ровным тонким слоем при помощи шпателя, ватно-марлевого тампона или руками в стерильных резиновых перчатках и втирают лёгкими массирующими движениями.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ

Убой животных на мясо разрешается через 3 суток после последнего применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям. Молоко разрешается использовать в пищевых целях через 3 суток после последнего применения препарата.