

ФЛОРИТИЛ

Комплексный антибактериальный препарат для лечения инфекций дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта

**ВПЕРВЫЕ
МАКРОЛИД + ФЕНИКОЛ
В ФОРМЕ ОРАЛЬНОГО
И ИНЪЕКЦИОННОГО
РАСТВОРОВ!**

- Синергидное действие компонентов против грамположительной, грамотрицательной и смешанной микрофлоры
- Высокая эффективность в отношении бактерий, вырабатывающих ацетилтрансферазы и β -лактамазы



СОСТАВ

В 1 мл содержится:
Флорфеникола – 100 мг, Тилозина тартрата – 50 мг.

ПОКАЗАНИЯ

Применяют сельскохозяйственным животным и с/х птице, при бактериальных заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к флорфениколу и тилозину тартрату, в том числе:

- инфекций органов дыхания у свиней, в т. ч. легочного пастереллеза, плевропневмонии свиней, актинобациллезной плевропневмонии свиней (АПП), энзоотической плевропневмонии свиней, микоплазмоза, атрофического ринита свиней;
- инфекций органов дыхания у КРС, вызванных *Streptococcus* spp., *Pasteurella* spp., а также инфекций, вызванных *Klebsiella pneumoniae*, *Haemophilus somnus*, *Bordetella bronchiseptica*, *Mycoplasma* spp., *Rickettsia* spp.;
- некробактериоза КРС, вызванного *Fusobacterium necrophorum*;
- инфекционного кератоконъюнктивита у КРС, вызванного *Moraxella bovis*;
- стафилококкоза;
- кожных заболеваний;
- вторичных бактериальных инфекций, вызванных микроорганизмами чувствительными к компонентам препарата.



Внешний вид, упаковка и препарат может отличаться от изображения

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ИНЪЕКЦИОННОГО РАСТВОРА

Препарат Флоритил вводят сельскохозяйственным животным внутримышечно 1 раз в сутки в дозе 1 мл на 10 кг живой массы. Мелким домашним животным – внутримышечно или подкожно 1 раз в сутки в дозе 1 мл на 10 кг живой массы. Курс лечения составляет 3-5 суток.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ОРАЛЬНОГО РАСТВОРА

Перорально индивидуально или групповым способом с водой для поения в следующих суточных дозах: цыплята в возрасте до 4-х недель – 1,0 л препарата на 1000 л воды; цыплята старше 4-х недель – 2,0 л препарата на 1000 л воды; поросята, телята, козлята, ягнята – 0,1 мл препарата на 1 кг живой массы. Курс лечения составляет 5-7 суток, курс профилактики – 3 суток.

Заказывайте у вашего поставщика

Произведено

